

KDY MIMOŘÁDNOU KONTROLU?

1. Při HOREČKÁCH
2. Při onemocnění provázeném HNISÁNÍM
3. Při onemocnění s PROVÁZENÉM PRŮJMEM a ZVRACENÍM
4. Při každém ÚRAZU
5. Před OPERACÍ
6. Objeví-li se ŽÍZEŇ, celková SLABOST, SVĚDĚNÍ apod.
7. Objevují-li se při pravidelném jídle příznaky HYPOGLYKÉMIE (hlad, pocení, třes apod.)

PRŮKAZ NOSTE STÁLE PŘI SOBĚ!

Zdravotnické zařízení

Průkaz pro

DIABETIKA

Jméno

Bydliště

Léčím se:

INZULÍNEM

PAD

DIETOU

PŘI NEVOLNOSTI, PŘI BEZVĚDOMÍ

**Kdyby se mi udělalo náhle nevolno,
prosím:**

- OKAMŽITĚ MI PODEJTE **RYCHLE PŮSOBÍCÍ CUKR** (MÁM JEJ S SEBOU) KOUTKEM ÚST MEZI TVÁŘ A ZUBY
- PŘIVOLEJTE LÉKAŘE NEBO MNE DOPRAVTE DO NEMOCNICE PŘI BEZVĚDOMÍ

