

Kdy kontaktovat lékaře?

1. Při infekčním onemocnění, zejména provázeném horečkou nebo hnisáním.
2. Při onemocnění s průjmem a zvracením.
3. Při každém vážnějším úrazu nebo před operací.
4. Objeví-li se příznaky nedostatku inzulínu (žízeň, únava, svědění apod.).
5. Objeví-li se opakovaně příznaky hypoglykemie (hlad, pocení, třes, bolesti hlavy, poruchy soustředění apod.).

PRŮKAZ DIABETIKA

Léčím se:

☐

Dietou

☐

PAD

☐

Inzulínem

Jméno:

Bydliště:

ZP:

Rodné číslo:

Razítko diabetologické ambulance

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Jsem DIABETIK

Při léčbě tabletami nebo inzulínem může dojít ke stavu zmatenosti, útlumu, ospalosti nebo agresivity, někdy připomínající chování v opilosti.

Naleznete-li mne v tomto stavu, podejte mi, prosím, sladký nápoj.

Pokud mne naleznete v bezvědomí, nepodávejte mi sladký nápoj, protože bych jej mohl (mohla) vdechnout. Zavolejte, prosím, ihned lékaře a informujte ho, že jsem diabetik (diabetička)

elekta
s.r.o.

Elekta, s.r.o., V Braňce 262, 252 17 Tachovice, Česká republika

helpline: 800 244 555, telefon: 277 015 011

web: www.elekta.cz, e-mail: elekta@elekta.cz

GALILEO

GOLD | invertovaný cukrový sirup
okamžitá energie

[illegible]